



エプリノメクチン・ドロップオン® 「KS」 キャンペーン 第2弾

動物用医薬品 使用基準

エプリノメクチン・ドロップオン® 「KS」

アベルメクチン系駆虫剤



キャンペーン期間

2023年
9月1日～30日迄

牛乳出荷前の使用禁止期間が無いから
搾乳中でも投与が可能

気付かぬうちに牛体内に棲みつき、
じわじわと栄養を横取りしている内部寄生虫と
牛にストレスを与え続ける外部寄生虫。

定期的な投与で寄生虫の駆除による生産性の向上を。

製品名	規格	通常価格
エプリノメクチン・ドロップオン® 「KS」	1L	¥20,900
	2.5L	¥50,600

キャンペーン価格



¥20,350

550円お得!



¥49,500

1,100円お得!

※ 金額は全て税込表示です。

■キャンペーン内容： 期間中に以下の条件を満たしたすべてのお客様に、「ロゴ入りパーカー」もしくは「ロゴ入りジャケット」をプレゼントいたします。


エプリノメクチン・ドロップオン® 「KS」 1L・2本以上
エプリノメクチン・ドロップオン® 「KS」 2.5L・1本以上

寄生虫をしっかりと駆除

シラミの駆除効果試験では、100%に近い駆除効果が確認されています。

シラミの駆除効果試験

シラミ生存率



■ 無投与群
■ 試験群

供試牛	交雑種 雄
無投与群	5頭 (平均体重245kg) 処置無し
試験群	5頭 (平均体重251kg) エプリノメクチンとして500 μ g/kg体重投与
試験手順	投薬の2日前、投与8日後、18日後に 1頭当たりシラミ59~63匹を 人工的に寄生させ、 投薬30分後、10日後、20日後に回収し、 生存シラミ数をカウントした。



共立製薬(株)社内資料

成分及び分量

有効成分	含量
エプリノメクチン	0.5g

効能又は効果

牛の下記の内部寄生虫及び外部寄生虫の駆除
：内部寄生虫—オステルターストマタ、クーパーリア、
毛様線虫、ネマトジルス、牛鞭虫、牛鉤虫及び牛肺虫
：外部寄生虫—疥癬ダニ（食皮ヒゼンダニ）、
シラミ及びハジラミ

用法及び用量

体重1kg当たりエプリノメクチンとして
500 μ g（本剤として0.1mL）を1回、
牛の背線部のき甲から尾根にかけて直線的に注ぐ。

使用禁止期間

牛：食用に供するためにと殺する前
20日間

貯法

遮光、室温保存、気密容器

包装

1L
2.5L



注意—使用基準の定めるところにより使用すること

*ご使用に際しては、製品添付文書をお読みください。

製造販売業者

共立製薬株式会社
東京都千代田区九段南 1-5-10
お問い合わせ先: TEL 03-3264-7559 (学術)